


# 外傷傷口縫合 注意事項



外科 製作

諮詢專線：(04)7113456#1171

讚美專線：0809-055215

住址：彰化市中山路一段366號

服務專線：04-7113456



彰化基督教醫療財團法人

**漢銘基督教醫院**

CHANGHUA CHRISTIAN MEDICAL FOUNDATION  
HANMING CHRISTIAN HOSPITAL

制訂日期：2019年08月

1. 保持傷口敷料清潔乾燥，淋浴時可用膠帶覆蓋傷口。
2. 密切注意傷口處有無再出血情形，受傷後8-12小時組織會繼續腫脹，請抬高受傷部位以減低腫脹程度。
3. 如傷口在關節處，應保持關節平直以防牽扯縫線而裂開或再度出血。
4. 勿在傷口處塗抹任何未經醫師許可藥膏以免發炎。
5. 傷口於3-4天為高感染時期，請注意傷口如出現以下徵狀：發紅、腫脹、疼痛、出現分泌物、發燒等應立即返院檢查。
6. 避免患處劇烈運動以防傷口再裂開。
7. 按醫師囑咐：如期至門診換藥及拆線。
8. 一般傷口約7-14天，需到一般外科門診拆線。
9. 居家簡易傷口更換敷料方法：
  - 先用滅菌棉棒將生理食鹽水由內往外將傷口分泌物擦拭乾淨。  
(若傷口無感染情形時，可直接用生理食鹽水由內往外將傷口分泌物擦拭乾淨即可)
  - 接著用滅菌棉棒將1%的優碘由內往外將優碘擦拭乾淨，待30秒後。
  - 再用生理食鹽水由內往外將優碘擦拭乾淨。
  - 最後用滅菌棉棒沾取適量的藥膏塗擦於傷口上 覆蓋滅菌紗布。

漢銘基督教醫院關心您！