

一、換藥之用物準備

1. 紗布、Y型紗布或棉墊(依醫師吩咐)
2. 無菌棉枝
3. 紙膠
4. 優碘藥水(開封保存6個月)
5. 生理食鹽水
6. 2%克菌寧殺菌水溶液(開封保存1個月)
7. 手套



備註:

1. 生理食鹽水，開瓶後24小時未用完須丟棄，建議購買小瓶生理食鹽水。
2. 以上用物您可在至本院一樓萊爾富購買。
3. 克菌寧殺菌水溶液勿與生理食鹽水混合使用，不可用於小孩及頸部以上傷口。


二、換藥步驟



1. 換藥前後需洗手。
2. 移除舊紗布，並觀察紗布有無異常分泌物(膿、黃或綠色)或異味(必要時可戴手套)。
3. 沾取溶液(以不滴水為原則，棉枝一枝只能用一次)。
4. 以無菌原則進行傷口換藥。



一般傷口換藥說明



- (1) 優碘消毒方式：
傷口有分泌物，先以生理食鹽水清潔，再以優碘消毒傷口，30秒後再用生理食鹽水清潔。(由內而外，環形消毒：勿在同一處來回擦拭。)



- (2) 克菌寧殺菌水溶液消毒方式：
以棉枝沾菌寧由內而外消毒，勿在同一處來回擦拭。




- (3) 手指抓住紗布兩角，覆蓋住傷口。勿觸摸紗布中間部份，以免造成傷口感染。



- (4) 以紙膠固定四周不可用拉扯方式黏貼，以免造成皮膚受損。

引流管傷口換藥說明




- (1) 優碘消毒方式：
以一手輕提引流管遠端，將沾優碘的棉枝，由內而外，環形消毒，30秒後以沾生理食鹽水的棉枝，再擦拭一次。
- (2) 克菌寧殺菌水溶液消毒方式：
將沾菌寧的棉枝，由內而外，環形消毒。



(3)手指抓住Y型紗布兩邊角，一塊開口向上，一塊開口向下蓋住傷口。

(4)以膠布固定四周。再取一段紙膠將引流管固定於身體上，避免因拉扯而脫出。



傷口換藥須知



三、換藥步驟

- 1.傷口換藥次數，人工敷藥請依醫師指示。
- 2.當紗布有分泌物滲濕、滲血、弄髒或流汗導致紗布潮濕，應立即換藥。
- 3.傷口未拆線或尚有引流管時，應採擦澡方式，維持傷口乾燥。
- 4.棉棒碰觸到其他物品不可再使用。
- 5.已拆封未用完之紗布棉枝及生理食鹽水，應予丟棄避免感染。
- 6.有以下情形，應儘快返回醫院看診：

自我評量(是非題)

- () 1.傷口敷料滲濕了不需要立即換藥，等時間到再換藥即可。
- () 2.傷口有分泌物，如：膿、有異味應返回醫院看診。

題號	1	2
解答	X	0

參考資料：

劉芹芳、洪麗真、謝家如(2017)·皮膚系統疾病之護理·於
劉雪娥總校閱，成人外科護理下冊(七版，1052—1065頁)·台北:華杏

門診護理組製作
諮詢專線：(04)7113456#8051
讚美專線：0809-055215
住址：彰化市中山路一段366號
服務專線：04-7113456



彰化基督教醫療財團法人
漢銘基督教醫院
CHANGHUA CHRISTIAN MEDICAL FOUNDATION
HANMING CHRISTIAN HOSPITAL

制訂日期：2021年03月
51500-單張-中文-519-01