

新型口服抗凝血藥 使用須知

(直接作用型口服抗凝血藥)



艾必克凝 里先安 拜瑞妥 普栓達



藥劑課 製作

諮詢專線：(04)7113456#8123

讚美專線：0809-055215

住址：彰化市中山路一段366號

服務專線：04-7113456



彰化基督教醫療財團法人
漢銘基督教醫院

CHANGHUA CHRISTIAN MEDICAL FOUNDATION
HANMING CHRISTIAN HOSPITAL

制定日期：2022年07月

51690-單張-中文-026-01

一、新型口服抗凝血藥品項

中/英文商品名	成分名	請勾選用藥品項	含量	外觀
艾必克凝® Eliquis®	Apixaban	☐	5 毫克	
		☐	2.5 毫克	
里先安® Lixiana®	Edoxaban	☐	60 毫克	
		☐	30 毫克	
		☐	15 毫克	
克拜瑞妥® Xarelto®	Rivaroxaban	☐	20 毫克	
		☐	15 毫克	
		☐	10 毫克	
		☐	2.5 毫克	
普栓達® Pradaxa®	Dabigatran	☐	150 毫克	
		☐	110 毫克	
		☐	75 毫克	

二、治療用途

預防血栓(血塊)形成，避免血管阻塞。

三、須主動告知醫師的事項

1. 肝腎疾病、異常出血病史等。
2. 已懷孕/哺乳或計畫懷孕/哺乳。
3. 目前正使用抗血栓藥、消炎止痛藥、抗心律不整藥、抗黴菌藥、中草藥、健康食品等。
4. 新用或停用任何藥品。
5. 接受任何外科手術(含牙科)或侵入性檢查前，務必告知醫師目前使用抗凝血藥，諮詢是否需暫時停藥及再次用藥時間。

四、安全服藥法則

※怎麼吃藥

- (1) 請依醫師指示藥量定時服用，不可任意增減藥量或停藥。
- (2) 艾必克凝：飯後服用，避免大量攝取葡萄柚或葡萄柚汁。
- (3) 里先安：飯後服用。
- (4) 拜瑞妥：飯中服用，避免大量攝取葡萄柚或葡萄柚汁。【註】飯中：服藥後立即用餐或餐後立即服藥。
- (5) 普栓達：飯後服用，須**整粒**吞服，切勿打開膠囊、壓碎或咀嚼服用，避免增加出血風險。

※忘記吃藥怎麼辦？

原服藥頻次	可補服藥物的時限
每日1次	超過原服藥時間點 12小時內
每日2次	超過原服藥時間點 6小時內

若已接近或已到下次服藥時間，只需服用當次藥量，**切勿服用雙倍藥量**。

※可能的副作用

若出現下列症狀，請立即告知醫療人員或就醫。

- (1) 異常出血：不明原因的瘀青、流鼻血、牙齦流血、血尿、血便或黑便、咳血或嘔吐物帶血(咖啡色)。
- (2) 過敏：皮膚搔癢、脫皮或腫脹、皮疹、嘴唇或喉頭腫脹。
- (3) 其他：胸悶、呼吸困難、突發性嚴重頭痛或腹痛、黃疸。

※出現下列疑似血栓症狀時，應立即就醫。

突然手或腳無力、突然口齒不清或無法說話、頭暈、身體麻木或刺痛感、視覺異常或喪失視力、新產生的四肢腫脹或疼痛、呼吸短促、胸痛或咳血。

※日常活動注意事項

- (1) 建議使用軟毛牙刷、電動刮鬍刀，減少流血機會。
- (2) 避免容易導致受傷的活動，如：打籃球、拳擊等運動。

學習自我評量(是非題)

- () 1. 下列何者為服用抗凝血藥時應注意之出血危險訊號？
①牙齦異常出血 ②血便血尿
③不明原因的瘀傷 ④以上皆是
- () 2. 若要接受手術或侵入性檢查，是否需先告知醫師目前正在使用抗凝血藥，並詢問是否需暫時停藥及再次用藥的時間。
①是 ②否

參考資料：

1. FDA: Medication guide 2022.
2. Patient drug information, UpToDate 2022.
3. 藥品仿單。
4. U.S. National Library of Medicine. Med-line-Plus 2022.
5. 彰基藥學部(2022)·新型口服抗凝血藥使用須知(第一版)·衛教單張。

題 號	1	2
解 答	④	①