

# 輸血 注意事項



內科病房製作

諮詢專線：(04)7113456#8791

讚美專線：0809-055215

住址：彰化市中山路一段366號

服務專線：04-7113456



彰化基督教醫療財團法人  
**漢銘基督教醫院**

CHANGHUA CHRISTIAN MEDICAL FOUNDATION  
HANMING CHRISTIAN HOSPITAL


制定日期：2021年03月

修訂日期：2024年06月(二版)

51500-單張-中文-016-02


## 一、為什麼要輸血？

貧血、大量出血、造血機能缺陷或白血病、淋巴瘤等惡性病因素，其血球的破壞或流失大於製造的速度，需要輸血以維持人體正常生理功能。



## 二、輸血同意書的簽署

醫護人員會在輸血前請您簽署「輸血同意書」。




## 三、何謂輸血反應？

輸血跟服用藥物一樣也可能會產生副作用，與輸血相關之任何生理反應均稱為輸血反應，也許發生在輸血過程中或輸血後。輸血反應大致分為急性與慢性兩類，急性輸血反應通常於輸血後24小時內發生，而慢性輸血反應通常發生在輸血後24小時至28天。若因為特殊體質（如過敏反應）或是血液中有被檢驗出對抗血球之抗體時，每次輸血時，均可能會發生反覆性輸血反應。當曾有不明原因之輸血反應病史時，也要於每次輸血時小心觀察是否有輸血反應。

## 四、輸血注意事項

1. 過程可能會引起輸血反應，因此剛開始輸血的15分鐘內輸血速度會比較慢，若沒有不良反應出現才會恢復正常速度。

注意輸血  
反應



15分鐘內

2. 勿自行輸血之流速。
3. 輸血時或輸血後有下列反應，請立即告知照顧您的醫護人員。

- (1) 皮膚有蕁麻疹或發癢的情形。
- (2) 發冷、發熱、冷顫。
- (3) 頭暈、頭痛。
- (4) 心跳加速或變慢、休克。
- (5) 胸悶、呼吸快速、困難。
- (6) 血尿、尿量減少。
- (7) 肌肉、胸痛、背痛。
- (8) 噁心、嘔吐。
- (9) 黃疸、紫斑、出血。
- (10) 感覺不安、例如：憂慮、恐懼、有刺痛及麻木不舒服的感覺。
- (11) 輸血之注射部位，沿著血管有發紅、熱痛的情形。



## 五、出院注意事項

1. 持續性高燒、嚴重過敏、發紺或是血尿出現時，請立即就醫。
2. 輸血時曾發生輸血反應，下次接受輸血前，請主動提醒醫護人員。

若有不適反應，千萬不可以忍耐，一定要馬上告知醫護人員，以免造成嚴重的後果。



## 自我評量 (是非題)

- ( ) 1. 當輸血速度慢時，為了怕不順，可自行調整輸血的速度。
- ( ) 2. 輸血時或輸血後有不適反應，應立即告知照顧您的醫護人員。

參考資料：

資訊化輸血操作指引|CW-51500-035

(20201013修)

彰基護理部(2022)·輸血注意事項(第十版)·衛教單張。

題號	1	2
解答	X	0