

使用阿托品 (Atropine) 眼藥水之注意事項



眼科門診 製作

諮詢專線：(04)7113456#8001

讚美專線：0809-055215

住址：彰化市中山路一段366號

服務專線：04-7113456



彰化基督教醫療財團法人
漢銘基督教醫院

CHANGHUA CHRISTIAN MEDICAL FOUNDATION
HANMING CHRISTIAN HOSPITAL

制定日期：2021年03月

修訂日期：2026年03月(三版)

51500-單張-中文-142-03

一、為什麼要點阿托品眼藥水：

1. 為了正確驗光：看東西的時候，眼睛內的肌肉會收縮或放鬆，幫助水晶體調整厚度來調好焦點，才能將東西看清楚，這種作用叫做『調節力』，年齡愈小的人『調節力』愈強，以致影響眼睛屈折度(近視、遠視、亂視度數)的檢查，所以檢查兒童的屈折度，尤其視力不好時，必須點眼藥水來放鬆眼睛的肌肉，才能得到正確的度數，才能決定是否需要戴鏡，才不致因為戴了度數不對的眼鏡或因為延遲矯正，而使情形愈來愈糟。
2. 為了控制或減緩近視度數的增加。


二、點阿托品眼藥水後發生之變化：

1. 看東西的時候焦點不準，尤其看不清楚處近處的東西(特別是有遠視、亂視或輕度近視的人)，看書寫字宜保持距離。

2. 瞳孔放大，看亮處覺得怕光、眩目，戶外活動宜戴遮陽帽或是墨鏡。
3. 這些變化只是暫時性的，停止點藥後一至二星期即可恢復原狀，不必擔心。

三、阿托品眼藥水的使用方法：

1. 從民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日到 _____ 年 _____ 月 _____ 日，一天點一次睡前點，一次點一滴即可，不可間斷，直到檢查完為止。
2. 點過眼藥水後請馬上將『淚囊』壓住或眼睛輕輕閉住5分鐘，最好保持仰臥的姿勢。




3. 幼兒或體質比較特殊的人有時會發生發燒、紅臉之現象（停藥後均會自癒不必驚慌）如果有如此現象，請繼續點藥，並於次日前來複診。

5. 用藥後，瞳孔會放大，視力會模糊約4-5小時，會自然恢復。
6. 點眼後，請勿駕駛或操作危險機械。

四、阿托品眼藥水的注意事項：

1. 開封後，可儲存於室溫下，保存一個月。
2. 此眼藥水是專供檢查及治療之用，除本人以外絕對禁止他人使用。
3. 近視患者長期點此藥時，建議佩戴可隔絕紫外線之眼鏡。
4. 若同時使用一種以上眼藥，建議至少間隔 5 分鐘。



自我評量(是非題)

- () 1. 使用阿托品眼藥水後，瞳孔會放大，戶外活動宜戴遮陽帽或墨鏡。
- () 2. 幼兒或體質比較特殊的人有時會發生發燒、臉紅之現象，此為過敏須立即停藥。

參考資料：

彰化基督教醫院/線上服務/藥品辨識系統/

阿托品眼藥水·2026年2月10日取自

[https://www.cch.org.tw/drug_2.aspx?](https://www.cch.org.tw/drug_2.aspx?CODE=MDATRA)

CODE=MDATRA



題 號	1	2
解 答	0	x