

預防化學藥物 外滲照護注意事項



內科病房製作

諮詢專線：(04)7113456#8591

讚美專線：0809-055215

住址：彰化市中山路一段366號

服務專線：04-7113456



彰化基督教醫療財團法人
漢銘基督教醫院

CHANGHUA CHRISTIAN MEDICAL FOUNDATION
HANMING CHRISTIAN HOSPITAL

制定日期：2021年03月

修訂日期：2025年09月(三版)

51500-單張-中文-167-03

一、什麼是化學治療藥物外滲

當化學治療藥物於靜脈注射時，由靜脈或靜脈留置針外滲至皮下組織，造成局部肌肉組織的傷害或壞死。

二、化學藥物輸注管路注意事項

1. **不可以自行調整**滴數或輸注幫浦設定，以免影響藥效或增加毒性。
2. 勿將化學藥物滴注機器帶離病房，以免牽扯管路造成注射器滑脫。
3. 睡覺及活動時，**勿壓迫或睡向注射部位**，以防人工血管角針或靜脈留置針移位造成藥物外滲。
4. 注射部位有**刺痛燒灼感、紅腫或滲漏及滴注不順**時，應告知醫護人員。
5. 藥物輸注期間有**嘔吐、呼吸急促、心悸或其他身體不適**，請告知醫護人員處理。
6. 當藥物外滲時，醫護人員視情況請您局部**冰敷或熱敷**患部，至少 15-30分鐘，每天四次。
7. **改變姿勢時，不要以注射化療藥物的手臂來支撐身體或過度用力。**

8. 藥物輸注期間，**應有家屬在旁陪伴**，協助您住院期間的日常生活所需。
9. 化學治療藥物期間，若如廁，可使用尿壺或便盆，減少化學治療藥物外滲機會。
10. 化療藥物輸注期間，點滴架應放置於注射側或便於下床側。

自我評量(是非題)

1. 睡覺及活動時，勿壓迫注射部位。
2. 注射部位疼痛需立即告知護理人員。
3. 勿將化療藥物機器帶離病房。

參考資料：

漢銘基督教醫院護理部·化學治療藥物預防外滲與外滲後照護指引·
編號：W-51500-105。

題 號	1	2	3
解 答	0	0	0