

心絞痛病人 使用硝化甘油 注意事項



急診室 製作

諮詢專線：(04)7113456#8116

讚美專線：0809-055215

住址：彰化市中山路一段366號

服務專線：04-7113456



彰化基督教醫療財團法人
漢銘基督教醫院

CHANGHUA CHRISTIAN MEDICAL FOUNDATION
HANMING CHRISTIAN HOSPITAL

制定日期：2021年04月

修訂日期：2026年07月(三版)

51500-單張-中文-182-03

- 一、隨身攜帶硝化甘油藥錠，胸痛發作時，可舌下含服一錠，藥效發揮可能會覺得舌上有灼熱感，頭有發脹的感覺。
- 二、每隔五分鐘含服一顆，至胸痛緩解，如連續三顆不能緩解須立刻返回急診室。
(可能是急性心肌梗塞發作)
- 三、藥品需放置於原玻璃瓶容器內、瓶蓋蓋緊、以及乾燥處，開瓶後之藥效六個月後會消失。
- 四、**藥品副作用**：頭痛、臉部潮紅、低血壓、暈眩，服用藥物後需採舒適姿位（如坐姿或半坐臥姿）並注意安全。



參考資料：

彰基急診部(2023)·心絞痛病人使用硝化甘油注意事項(第七版)·衛教單張。