

# 兒童術後麻醉 照護須知



麻醉科 製作

諮詢專線：(04)7113456#8311

讚美專線：0809-055215

住址：彰化市中山路一段366號

服務專線：04-7113456



彰化基督教醫療財團法人

**漢銘基督教醫院**

CHANGHUA CHRISTIAN MEDICAL FOUNDATION  
HANMING CHRISTIAN HOSPITAL

制定日期：2021年03月

修訂日期：2024年02月(二版)

51500-單張-中文-503-02

## 一、前言

當小朋友完成手術後，因為麻醉藥物還沒有完全退掉，所以會先到恢復室觀察，等意識完全清醒後，恢復室的護理人員會請父母帶小朋友回家。

## 二、回家後注意事項

1. 如果小朋友都沒有表示肚子餓，想要吃東西時，表示意識還沒有完全清醒，此時不要主動拿食物給小朋友吃。
2. 小朋友肚子餓想吃東西時（不會講話的嬰幼兒會用哭來表示），可以先試著喝開水 10-20ml，如果出現嘔吐，請延後 2 小時，讓小朋友更清醒，再嘗試吃東西。
3. 手術後 1-2 天內，小孩的體溫可能會上升 0.5-1°C 左右，若體溫沒有超過 38°C 請不要緊張，持續觀察體溫變化就可以，如果體溫超過 39°C，出現嗜睡、寒顫或其他不舒服的症狀時，必須與醫師聯絡或回到醫院就診，找出發燒的原因。

4. 請按照預約掛號的時間回診追蹤。
5. 當傷口嚴重出血、身體出現不舒服時，應立即回診。
6. 有任何照護問題，請打電話：  
04-7113456轉 8313 恢復室諮詢。

### 學習自我評量(是非題)

- ( ) 1. 手術後，小朋友喝水後如果有嘔吐，仍然可以吃東西。
- ( ) 2. 如果體溫超過 39°C，並出現寒顫、嗜睡等症狀時，請務必回醫院檢查發燒原因。

參考資料：

李睿軒，張怡貞，胡芳綺，石惠美，陳麗貞，施美娟(2018)．降低學齡前期兒童於急診接受靜脈注射疼痛指數．健康科技期刊，4(2)，20-34。

張綠怡，蔡綠蓉(2018)．住院兒童之反應及其護理．實用兒科護理。

題目	1	2
答案	X	0