

口服 RU486 施行 人工流產衛教單



婦產科門診 製作

諮詢專線：(04)7113456#8072

讚美專線：0809-055215

住址：彰化市中山路一段366號

服務專線：04-7113456



彰化基督教醫療財團法人
漢銘基督教醫院

CHANGHUA CHRISTIAN MEDICAL FOUNDATION
HANMING CHRISTIAN HOSPITAL

制定日期：2021年03月

修訂日期：2026年02月(三版)

51500-單張-中文-704-03

- 一、口服RU486，中止懷孕之成功率：92%~95%（懷孕七週內）。
- 二、以口服RU486藥物，施行人工流產過程中應配合及注意事項。
 - (1)病患須在院內，醫護人員面前服藥（RU486）。
 - (2)病患用RU486之後的36到48小時後，病患應回到醫院，再服用前列腺素 misoprostol 400mcg (cytotec 200 mcg, 2 顆) 來誘發子宮收縮。如果病患未配合使用前列腺素，則本墮胎方法之失敗率可能提高。
 - (3)如果 2 小時內未見出血，再額外服用前列腺素 misoprostol 200mcg (cytotec 200mcg, 1 顆) 來加強子宮收縮。
(在服用前列腺素與服用後 2 小時內，病人應留在醫院觀察，並請帶衛生棉)。

因服用前列腺素之後，妊娠組織將於幾個小時內或接下來的幾天內排出，通常出血會一直持續到至下一次回診。因此，病患應留在醫院觀察 2 個小時，並需有隨時就醫的準備。

(4)病患在RU486錠服用後的二週內，應確實回診追蹤，經由進一步的方法（臨床檢查 β -HCG測定、超音波掃描等等），來確定妊娠組織是否完全排出，以及陰道出血的現象是否已經停止了。

(5)若病患仍繼續懷孕或妊娠組織未完全排出，孕婦應進行適當的治療（包括手術治療）。

在流產過程，可能發生大量、且時間較長的陰道出血（約14天）。幾乎所有的案例皆會有出血現象，且出血並不代表妊娠組織完全的被排出。在回診日期或治療過程尚未結束，未確認為完全流產之前，不可以到執行的醫院太遠的地方旅行，特別是陰道大量出血時，應到本院就醫或與本院聯絡。

電話：04-7113456 分機 8072
(婦產科門診時間)

孕婦如果服用RU486藥物人工流產仍繼續懷孕，可能會導致胎兒先天性缺陷。

三、施行口服RU486藥物人工流產可能發生不良反應。

- (1)大量出血（1.4%）。
- (2)服用前列腺素之後幾個小時，經常有子宮收縮或痙攣（10-50%）。
- (3)服用前列腺素之後，經常會出現噁心、嘔吐、下痢等症狀。
- (4)低血壓症狀（0.25%）。
- (5)其他偶發之病變。

● 患者口服RU486藥物之日期：

_____年 月 日

● 患者再返院服用前列腺素之日期為：

_____年 月 日 診

_____醫師 號

● 患者返院，追蹤確認妊娠組織是否完全排出日期為：

_____年 月 日 診

_____醫師 號

● 中醫回診日期：

_____年 月 日 診

_____醫師 號

自我評量（是非題）

- () 1. 懷孕七週內，口服RU486，中止懷孕之成功率為92%-95%。
- () 2. 孕婦如果服用RU486藥物人工流產仍繼續懷孕，可能會導致胎兒先天性缺陷。

參考資料：

Mifepristone【OAPA】(RU-486)

(Apano[®])200mg/Tab藥物仿單

台灣婦產科醫學會·人工流產諮詢參考指引。

題 號	1	2
解 答	○	○

漢銘基督教醫院關心您！