


結石病人返家後 注意事項



病房製作
諮詢專線：(04)7113456#8691
讚美專線：0809-055215
住址：彰化市中山路一段366號
服務專線：04-7113456



彰化基督教醫療財團法人
漢銘基督教醫院

CHANGHUA CHRISTIAN MEDICAL FOUNDATION
HANMING CHRISTIAN HOSPITAL

制定日期：2021年03月

修訂日期：2025年09月(三版)

51500-單張-中文-536-03

一、每日飲用水份至少 3000ml，
並維持 2000ml以上之尿液，
增加尿量以利結石排出。



二、每次排尿後，請注意觀察是否有結石排出。

三、解痙劑會使腸蠕動降低，可能會引起腹脹及便秘，多攝取蔬果及水份來預防。

四、若服用藥物治療三天後仍有以下症狀，請盡速返院治療。

如：發燒、解尿困難、血尿。



五、急診僅能提供緊急之處理，請
您繼續返回泌尿科門診持續追蹤治療。

自我評量(是非題)

- () 1.每日飲水至少3000ml，維持2000ml以上之尿液，以利結石排出。
- () 2.需至泌尿科門診追蹤。

參考資料：

彰基急診(2023)·結石病人返家注意事項
(第七版)·衛教單張。

題號	1	2
解答	0	0