


耳滴製劑 使用須知



藥劑課 製作

諮詢專線：(04)7113456#8123

讚美專線：0809-055215

住址：彰化市中山路一段366號

服務專線：04-7113456



彰化基督教醫療財團法人
漢銘基督教醫院
CHANGHUA CHRISTIAN MEDICAL FOUNDATION
HANMING CHRISTIAN HOSPITAL

制定日期：2025年09月

51690-單張-中文-007-01

一、如何正確使用“耳滴劑”

1. 用肥皂及清水將雙手洗淨。



2. 先使用濕的面巾清潔耳朵，再將耳朵擦乾。



3. 用手握住耳滴劑數分鐘，使溫度接近體溫。

4. 若滴劑原先就是混濁的懸浮液，使用前先充分振搖十秒鐘。


5. 側躺或傾斜患耳朝上。




6. 為了使藥液流入耳內，**成人要將耳朵往後上方拉**，**小孩要往後下方拉**。

7. 避免將耳滴劑插入耳內及接觸到瓶口，以保持藥液的清潔。

8. 滴正確的藥量入耳朵，然後輕拉耳朵使藥液流入。



9. 保持耳朵傾斜向上約**5-10分鐘**，或採用藥師、醫師建議的方法，使藥品停留在耳朵內。



10. 使用完畢後馬上將蓋子旋緊。

11. 點耳後再次洗淨雙手。

二、耳滴製劑用藥注意事項

- ◎避免瓶口碰觸耳朵或任何皮膚表面，因此盡可能請別人幫忙點藥。
- ◎小孩耳朵軟骨尚未發育完全，故小孩點耳時應將耳朵往後下方拉。
- ◎不要清洗瓶口，只要用乾衛生紙拭淨即可。
- ◎勿忘記用藥的時間。
- ◎若病情持續或惡化、給藥後出現耳道癢或有燒灼感，請立即與醫師或藥師聯絡。
- ◎藥液若變色則不可使用。
- ◎除非特別指示，一般儲存在室溫陰涼保存，不需冷藏。
- ◎將藥物存放在小孩無法取得之處。

學習自我評量(是非題)

- () 1. 為了使耳滴劑停留在耳內，點耳後應保持耳朵傾斜向上約5-10分鐘。
- () 2. 如果這次治療療程結束，耳滴劑仍有剩藥，可留到下次不舒服時使用。

參考資料：

1. American Society of Health-System Pharmacists (ASHP), 2022.
2. Cinahl Complete, 2022.
3. 彰基藥學部(2022)·耳滴製劑使用須知(第五版)·衛教單張。

題 號	1	2
解 答	O	X