


支氣管鏡檢查



護理部製作

諮詢專線：(04)7113456#8080

讚美專線：0809-055215

住址：彰化市中山路一段366號

服務專線：04-7113456



彰化基督教醫療財團法人
漢銘基督教醫院

CHANGHUA CHRISTIAN MEDICAL FOUNDATION
HANMING CHRISTIAN HOSPITAL

制定日期：2023年01月

修訂日期：2026年02月(二版)

51500-單張-中文-022-02

一、支氣管鏡檢適應症：

- 1.胸腔症狀包括：慢性咳嗽、咳血、侷限性哮鳴、聲音沙啞及不正常胸部 X 光。
- 2.肺炎、肺結核：對於取痰有困難的患者，藉支氣管鏡洗液做培養，以達到細菌學上診斷目的。
- 3.肺癌：以作為組織學診斷與疾病分期。
- 4.燒傷：評估是否有氣道燒傷與其嚴重性。
- 5.評估氣管內管位置。
- 6.氣管內異物取出。

二、檢查前準備：

- 1.檢查前請填妥檢查同意書，並請成年之家屬陪同。
- 2.此項檢查至少需空腹 **6 小時以上**，以避免操作時誤嚥導致吸入性肺炎。
(可服用降血壓藥物)
- 3.若有藥物過敏史、心肺疾病、中風出血及服用抗凝血劑或阿斯匹林等藥物的患者，請事先告知醫療人員。
- 4.檢查前需移除活動假牙。
- 5.醫療人員會向病人解釋操作過程，以減輕病人焦慮。

三、檢查時的注意事項：

- 1.檢查時會由喉頭噴灑局部麻醉劑，噴灑完畢後喉嚨會有異物感，此情形表示局部麻醉已發揮作用，如此操作過程中不適感會減到最低。
- 2.操作過程中會有異物感，有人甚至會有點窒息的感覺，但一定有足夠的空間呼吸，必要時會從鼻腔提供氧氣，以確保氧氣的充足；操作時患者不可說話，以免聲帶受傷，但操作過程中如有不舒服或胸痛可以舉手告知。

四、檢查後注意事項：

- 1.因為局部麻醉的藥效仍未退，所以**檢查後二個小時應避免進食**(包括喝水)，以免造成誤嚥。
- 2.有執行組織切片之患者，會有短暫及少量血痰，屬正常現象，不須過度驚慌；若是**持續大量咳血、劇烈胸痛胸悶、呼吸困難及發燒**等症狀，則應立即到醫院就診。

五、鎮靜止痛返家注意事項：

鎮靜止痛藥物常見副作用，包括頭暈、嗜睡、噁心、反應遲鈍等，可能會持續數小時之久，因此受檢查者務必遵守以下事項：

- 1.不可單獨開車或騎車回家，必須有家屬或朋友護送回家以確保安全。
- 2.回家後當天請盡量臥床休息，若下床活動時，需有人陪伴以預防跌倒。
- 3.不可從事操作機械之工作。
- 4.不可喝酒。
- 5.除了醫師處方藥外，盡量不要再服用其它藥物。

自我評量(是非題)

- () 1.檢查後2小時內不可馬上進食，以免噎到。
- () 2.檢查後若有多次發燒（超過38° C以上)可以不必理會。
- () 3.檢查後若有持續大量咳血、劇烈胸痛胸悶、呼吸困難等症狀請立即返院就醫。

請寫下您的問題



參考資料：

漢銘基督教醫院護理部·支氣管鏡檢查標準

作業流程·編號：CW-51560-21。

彰基護理部(2024)·支氣管鏡檢查(第七版)

·衛教單張。

題 號	1	2	3
解 答	0	X	0